

Часть 1. Тест.

Вопрос 1 ♣

Рассмотрим модель $Y_i = \mu + \varepsilon_i$, $E(\varepsilon_i) = 0$, $cov(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0, i \neq j$, $Var(\varepsilon_i) = \sigma_\varepsilon^2/X_i, i = 1, \dots, 4$ при $X = (1, 2, 3, 4)$, оцененную обычным и обобщенным МНК. Во сколько раз дисперсия оценки коэффициента μ для модели, оцененной обобщенным МНК с учетом особенностей ковариационной матрицы ошибок, будет меньше дисперсии оценки, полученной обычным МНК?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A 10
<input type="checkbox"/> B 30
<input type="checkbox"/> C 50 | <input type="checkbox"/> D 100
<input type="checkbox"/> E $\sqrt{10}$
<input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |
|---|--|

Вопрос 2 ♣

Для модели $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$ известно, что $cor(X_1, X_3) = cor(X_2, X_3) = 0$, $cor(X_1, X_2) = r$, где $r = -0.9$. Параметр обусловленности для матрицы $(\tilde{X}^T \tilde{X})$, где \tilde{X} - матрица центрированных и нормированных значений регрессоров, равен

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A $\sqrt{(1-r)/(1+r)}$
<input type="checkbox"/> B $\sqrt{(1-r\sqrt{2})/(1+r\sqrt{2})}$
<input type="checkbox"/> C $\sqrt{(1+r^2)/(1-r^2)}$ | <input type="checkbox"/> D $\sqrt{(1+r\sqrt{2})/(1-r\sqrt{2})}$
<input type="checkbox"/> E $\sqrt{(1+r)/(1-r)}$
<input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |
|---|--|

Вопрос 3 ♣

При проверке гипотезы $H_0 : g(\beta) = 0$ для параметров модели $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_n)$ с помощью теста Вальда, необходимо знать оценки параметров

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> A Регрессии на константу | <input type="checkbox"/> C Только модели без ограничений | <input type="checkbox"/> E Как модели с ограничениями, так и модели без ограничений |
| <input type="checkbox"/> B Регрессии на все факторы, кроме константы | <input type="checkbox"/> D Только модели с ограничениями | <input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |

Вопрос 4 ♣

Предельный эффект для непрерывной j -ой объясняющей переменной в логит модели рассчитывается по формуле

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> A $\hat{\beta}_j \frac{\exp(-Z)}{(1+\exp(-Z))^2}$ | <input type="checkbox"/> C $\hat{\beta}_j \frac{1}{(1+\exp(Z))^2}$ | <input type="checkbox"/> E $\hat{\beta}_j \frac{\exp(-Z)}{(1+\exp(Z))^2}$ |
| <input type="checkbox"/> B $\hat{\beta}_j \frac{1}{(1+\exp(-Z))^2}$ | <input type="checkbox"/> D $\hat{\beta}_j \frac{1}{\sqrt{2\pi} \exp(-\frac{Z^2}{2})}$ | <input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |

Вопрос 5 ♣

Если площадь под ROC кривой для модели бинарного выбора равна 0.5, то качество предсказания модели

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> А Не определяется этим показателем | <input type="checkbox"/> С Лучше, чем подбрасывание симметричной монетки | <input type="checkbox"/> Е Максимально возможное |
| <input type="checkbox"/> В Аналогично подбрасыванию симметричной монетки | <input type="checkbox"/> D Хуже, чем подбрасывание симметричной монетки | <input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |

Вопрос 6 ♣

Выборочная корреляция между переменными X_1 и X_2 равна 0.5. VIF для переменной X_1 в регрессии $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon, k > 4$

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> А Не менее 4/3 | <input type="checkbox"/> D Не более 0.5 |
| <input type="checkbox"/> В Не более 4/3 | <input type="checkbox"/> Е Не более 2 |
| <input type="checkbox"/> С Не менее 2 | <input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |

Вопрос 7 ♣

Для получения оценок LASSO регрессии $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$ используется критерий

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> А $\min_{\hat{\beta}}(RSS + \lambda \sum_{j=0}^k \hat{\beta}_j^2)$ | <input type="checkbox"/> С $\min_{\hat{\beta}}(RSS)$ | <input type="checkbox"/> Е $\min_{\hat{\beta}}(RSS + \lambda \sum_{j=0}^k \hat{\beta}_j)$ |
| <input type="checkbox"/> В $\min_{\hat{\beta}}(RSS + \lambda \sum_{j=0}^k \hat{\beta}_j)$ | <input type="checkbox"/> D пошагового исключения факторов | <input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |

Вопрос 8 ♣

Если функция плотности удовлетворяет условиям регулярности, оценки метода максимального правдоподобия

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> А Всегда состоятельные | <input type="checkbox"/> D Всегда неотрицательны |
| <input type="checkbox"/> В Несмещённые | <input type="checkbox"/> Е Всегда имеют нормальное распределение |
| <input type="checkbox"/> С Могут иметь произвольное асимптотическое распределение | <input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |

Вопрос 9 ♣

Если стандартные отклонения случайных возмущений в регрессии $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$ пропорциональны регрессору Z , то гетероскедастичность можно устранить

- ☐ A Поделив все факторы в исходном уравнении на Z
- ☐ B Поделив все факторы в исходном уравнении на \sqrt{Z}
- ☐ C Умножив все факторы в исходном уравнении на \sqrt{Z}
- ☐ D Умножив все факторы в исходном уравнении на Z
- ☐ E Поделив все факторы в исходном уравнении, кроме единичного столбца, на Z
- ☐ F Нет верного ответа.

Вопрос 10 ♣

Модель $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$ оценивается по 500 наблюдениям, $\varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2 I_{500})$. При проведении теста Уайта во вспомогательную регрессию входят исходные переменные, их квадраты и кросс-произведения. Дисперсия статистики Уайта при выполненной H_0 равна

- | | | |
|---|-------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> A 10 | <input type="checkbox"/> C 18 | <input type="checkbox"/> E 9 |
| <input type="checkbox"/> B невозможно вычислить по имеющимся данным | <input type="checkbox"/> D 20 | <input type="checkbox"/> F Нет верного ответа. |

Имя, фамилия и номер группы:

.....

Таблица заполняется проверяющим работу!

Тест	Задача 1	Задача 2	Задача 3	Задача 4	

Отметьте верный ответ в каждом вопросе ниже:

Вопрос 1 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 2 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 3 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 4 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 5 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 6 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 7 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 8 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 9 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Вопрос 10 : ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Часть 2. Задачи.

1. На основании наблюдений получена МНК оценка уравнения регрессии $\hat{Y}_i = 0.2Z_i + 0.3W_i$ и оценка дисперсии ошибок $\hat{\sigma}^2 = 0.04$. Матрица наблюдений регрессоров имеет вид

$$X^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ошибки имеют нормальное распределение.

Постройте 95% предиктивный интервал (доверительный интервал для индивидуального прогноза) в точке $Z = -1$, $W = 3$.

2. В модели множественной регрессии $Y = X\beta + \varepsilon$ выполнены все предпосылки классической линейной модели кроме предпосылки о гомоскедастичности. Вектор ошибок имеет нормальное распределение, а возможная гетероскедастичность имеет вид

$$\text{Var}(\varepsilon_i) = \begin{cases} \sigma_1^2, & \text{при } i \leq m; \\ \sigma_2^2, & \text{при } i > m. \end{cases}$$

Матрица X имеет размер n на $k + 1$.

Выведите формулу статистики LR-теста для проверки гипотезы о гомоскедастичности.

3. Рассмотрим модель $Y_i = \beta X_i + \varepsilon_i$, где ε_i — независимые случайные величины с $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0$ и $\text{Var}(\varepsilon_i) = 2018i$.

Найдите наиболее эффективную оценку для параметра β в классе всех линейных по Y несмещённых оценок.

4. По 1000 наблюдений Винни-Пух оценил логистическую модель $\mathbb{P}(Y_i = 1) = F(\beta_0 + \beta_1 X_i)$, где X_i — количество времени в часах, проведённое в гостях, а Y_i — факт застревания при выходе.

Оценки параметров равны $\hat{\beta}_0 = 1$, $\hat{\beta}_1 = 2$, с оценкой ковариационной матрицы

$$\begin{pmatrix} 0.25 & 0.1 \\ 0.1 & 0.36 \end{pmatrix}.$$

- а) Проверьте значимость отдельных коэффициентов при уровне значимости 5%;
- б) Найдите предельный эффект времени, проведённого в гостях, на вероятность застрять при выходе для получасового визита;
- в) Найдите максимально возможный предельный эффект.